



**ETIQUETA-PROSPECTO PARA:  
APIVAR  
Tira para colmenas**

CN:  
○

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

APIVAR  
Tira para colmenas

**COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS**

Cada tira contiene:

**Sustancia activa:**

Amitraz ..... 500 mg

Excipientes, c.s.p..... 15 g

**INDICACIONES DE USO**

Tratamiento de las parasitosis externas causadas por *Varroa jacobsoni*, sensible a amitraz.

**CONTRAINDICACIONES**

Ninguna

**REACCIONES ADVERSAS**

No conocidas

**ESPECIES DE DESTINO**

Abejas (*Apis mellifera*)

**POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Uso en las colmenas.

Insertar 2 tiras por colmena, colocándolas entre 2 panales.

Tipos de colmena:

- Colmenas tipo Dadant (perfección), colocar una tira entre el tercer y cuarto panal y la otra entre el séptimo y octavo panal, es decir fuera de la cámara de cría.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-03



- Colmenas tipo Layens, colocar una tira entre el quinto y sexto panal y la otra entre el noveno y décimo panal.

Retirar las tiras transcurridas 6 semanas.

Normas de uso y calendario de aplicación:

Deberá utilizarse en épocas de poca cría en la colmena. Dependiendo de las zonas climáticas se establecerá el calendario de aplicación:

Zonas cálidas: Agosto- Septiembre.

Zonas semicálidas: Noviembre - Diciembre.

Zonas frías: Enero- Febrero.

## **TIEMPO DE ESPERA**

Miel: 7 días.

No puede recogerse la miel cuando las tiras están presentes en la colmena.

## **PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar a temperatura inferior a 25°C, con el envase herméticamente cerrado.

Período de validez después de abierto el envase: Uso inmediato

## **ADVERTENCIAS ESPECIALES**

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Usar un equipo de protección personal consistente en guantes de goma al manipular el medicamento veterinario.

No comer, beber o fumar durante su utilización.

Lavarse las manos con agua abundante después de manipular el medicamento.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

El efecto toxicológico del amitraz se incrementa en presencia de sales de cobre y la actividad terapéutica disminuye en presencia de butóxido de piperonilo, por lo que el empleo simultáneo de estas dos sustancias con amitraz se debe de evitar.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

Se ha administrado 5 veces la dosis terapéutica, durante 6 semanas, no habiéndose detectado ningún efecto adverso.

## **PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.



## FECHA EN QUE FUE APROBADA LA ETIQUETA-PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Octubre de 2019

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Formato:** Sobre conteniendo 5 tiras dobles.

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

## FECHA DE CADUCIDAD

EXP: MM/YYYY

Lote y caducidad: ver en el dorso

Una vez abierto, uso inmediato.

## TAMAÑO DEL ENVASE

Sobre conteniendo 5 tiras dobles.

## NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1283 ESP

## NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lot: XXXX

## NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES

### Titular de la autorización de comercialización:

Véto-Pharma S.A.S.  
12-14 Rue de la Croix Martre  
91120 Palaiseau  
Francia

### Fabricante responsable de la liberación del lote:

Laboratoires Wyjolak  
Route de Saint Benoit  
Chaillac F-36310  
Francia  
pgendron.wyjolak@wanadoo.fr